

完全流体力学 試験問題

1990-9-21, 10:30~12:00

by E. Yamazato

1. 図に示すような流線図より, この流れはどういう型の流れを組み合わせたものかを説明せよ. また数値も含めた複素ポテンシャルを求めよ.
2. 図に示す二次元ディフューザ内を流量 $20\text{cm}^3/\text{s}$ の空気が流れている. いま空気の密度を $1.204\text{kg}/\text{m}^3$ として次の値を求めよ. (1) もし流れがポテンシャル流れとすればどういふ型の流れか. (2) ポテンシャル流れとして A 点における速度を求めよ. (3) A 点における圧力勾配を求めよ. (3) 一次元の流れと仮定したときの A 点の速度を求めよ.
3. 複素ポテンシャルが次式で表される流れの型を説明し, かつそれらの流れの速度ポテンシャルおよび流れの関数を求めよ.

$$(1) w = aze^{i\alpha} (\alpha > 0), (2) w = z^n (n = \frac{1}{2}), (3) w = -5i \ln z + 3z, (4) w = 2z + 3 \ln z$$

4. 速度 U の一様流れの中に, 循環 $-\Gamma$ の渦と $z = a$ に強さ Q の吹き出しがある場合 $z=0$ の渦に作用する力を求めよ. (10点)

(解)

1.

$$w = iUz + m \ln \frac{z - z_2}{z - z_1}, \quad z_1 = 0, \quad z_2 = 3 + 4i$$

$$U = 4\text{m}/\text{s}, \quad m = \frac{Q}{2\pi} = \frac{27 \times 1 \times 4}{2\pi} = \frac{54}{\pi}$$

$$w = i4z + \frac{54}{\pi} \ln \left[1 - \frac{3 + 4i}{z} \right]$$

2.

$$(1) \varphi = \ln r, \quad v_r = \frac{m'}{r}, \quad m' = \frac{Q'}{2\pi}$$

$$Q = \frac{60}{360} Q' = \frac{1}{6} Q', \quad Q' = 6Q = 6 \times 20 = 120\text{cm}^3/\text{s}, \quad m' = 19\text{cm}^3/\text{s}$$

$$(2) v_{rA} = \frac{m'}{r_A} = \frac{Q'}{2\pi r_A} = \frac{120}{(2\pi \times 20)} = 0.55\text{cm}/\text{s}$$

$$(3) v_r \frac{dv_r}{dr} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr}, \quad \frac{dp}{dr} = -\rho v_r \left(\frac{dv_r}{dr} \right)_A = \frac{\rho m'^2}{r_A^3}$$

$$\left(\frac{dp}{dr} \right)_A = \frac{(1.204 \times 10^{-6} \times 19.1^2)}{34.6^3} = 0.01 \times 10^{-6}$$

$$(4) v_{rA} = \frac{Q}{A} = \frac{20}{40} = 0.5\text{cm}/\text{s}$$

3.

(1) Parallel flow with $\theta = \alpha$

$$w = ar \{ (\cos(\theta + \alpha) + i \sin(\theta + \alpha)) \}$$

$$\varphi = ar \cos(\theta + \alpha), \quad \psi = ar \sin(\theta + \alpha)$$

$$\frac{dw}{dz} = ae^{i\alpha} = a(\cos \alpha + i \sin \alpha) = u - iv$$

$$u = a \cos \alpha, \quad v = -a \sin \alpha, \quad V = a$$

(2) Corner flow with $\theta = 2\pi$

$$z = re^{i\theta}, \quad w = \varphi + i\psi = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

$$\varphi = r^n \cos n\theta, \quad \psi = r^n \sin n\theta$$

$$\text{For } n = \frac{1}{2}, \quad \varphi = r^{1/2} \cos \frac{\theta}{2}, \quad \psi = r^{1/2} \sin \frac{\theta}{2}$$

(3) Parallel (U=3)+circulation($\Gamma = 10\pi$) flow

$$w = -5i \ln(re^{i\theta}) + 3re^{i\theta} = -5 \ln r + 5\theta + 3r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$\varphi = 5\theta + 3r \cos \theta, \quad \psi = 3r \sin \theta - 5 \ln r$$

(4) Parallel flow(U=2)+source flow(Q = 6\pi)

$$w = 2re^{i\theta} + 3 \ln(re^{i\theta})$$

$$\varphi = 2r \cos \theta + 3 \ln r, \quad \psi = 2r \sin \theta + 3\theta$$

4.

$$w = Uz - \frac{i\Gamma}{2\pi} \ln z + \frac{Q}{2\pi} \ln(z - a)$$

$$\frac{dw}{dz} = U - \frac{i\Gamma}{2\pi z} + \frac{Q}{2\pi(z - a)}$$

$$\left(\frac{dw}{dz}\right)^2 = U^2 - \frac{\Gamma^2}{4\pi^2 z^2} + \frac{Q^2}{4\pi^2 z^2} + \frac{Q^2}{4\pi^2 (z - a)^2} + \frac{iU\Gamma}{\pi z}$$

$$+ \frac{UQ}{\pi(z - a)} - \frac{i\Gamma Q}{2\pi^2 z(z - a)} - \frac{i\Gamma Q}{2\pi^2 az} - \frac{i\Gamma Q}{2\pi^2 a(z - a)}$$

$$\frac{1}{z(z - a)} = \frac{1}{a(z - a)} - \frac{1}{az}$$

$$\text{At } z=0: F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2} \oint \left(\frac{dw}{dz}\right)^2 dz = \frac{i\rho}{2} \left(\frac{iU\Gamma}{\pi} - \frac{i\Gamma Q}{2\pi^2 a}\right) = -i\rho\Gamma\left(U - \frac{Q}{2\pi a}\right)$$

$$F_x = 0, F_y = \rho\Gamma\left(U - \frac{Q}{2\pi a}\right)$$