

完全流体力学 試験問題

by E. Yamazato

9-18-1992, 10:25~12:05

1. (25) 速度成分が $u = ax + by$, $v = cx + dy$ で示される流れが非圧縮性流体となるための条件を示せ. また, 流れが渦なし流れとした場合の流れ関数を求めよ.
2. (30) 複素ポテンシャルが次式で表される流れの型を説明し、かつそれらの流れの速度ポテンシャルおよび流れの関数を求めよ.
3. (25) 速度 U の一様流れ中に強さ Q の吹き出しが原点にある場合、この流れ場に作用する力を求めよ.
4. (20) 二次元の渦流れで、その速度成分が $v_r = 0$, $v_\theta = \omega r$ なるときの渦度を求めよ.

完全流体力学 試験問題

by E. Yamazato

9-18-1992, 10:25~12:05

1. (25) 速度成分が $u = ax + by$, $v = cx + dy$ で示される流れが非圧縮性流体となるための条件を示せ. また, 流れが渦なし流れとした場合の流れ関数を求めよ.

(解)

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} &= 0, \quad a + d = 0 \\ u = \frac{\partial \psi}{\partial y} &= ax + by, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = cx + dy \\ \psi &= axy + \frac{b}{2}y^2 + f(x), \quad \psi = -\frac{c}{2}x^2 - dxy + f(y) = axy - \frac{c}{2}x^2 + f(y) \\ \psi &= axy + \frac{1}{2}(by^2 - cx^2) + const. \\ \text{For irrotational flow, } \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial v}{\partial x}, \quad b = c, \quad \psi = axy + \frac{b}{2}(y^2 - x^2) + const. \end{aligned}$$

2. (30) 複素ポテンシャルが次式で表される流れの型を説明し、かつそれらの流れの速度ポテンシャルおよび流れの関数を求めよ.

(1) $w = aze^{i\alpha}$ ($\alpha > 0$), (2) $w = z^n$ ($n = \frac{1}{2}$), (3) $w = -5i \ln z + 3z$, (4) $w = 2z + 3 \ln z$

(解)

(1) Parallel flow with $\theta = \alpha$

$$\begin{aligned} w &= ar\{(\cos(\theta + \alpha) + i \sin(\theta + \alpha))\} \\ \varphi &= ar \cos(\theta + \alpha), \quad \psi = ar \sin(\theta + \alpha) \\ \frac{dw}{dz} &= ae^{i\alpha} = a(\cos \alpha + i \sin \alpha) = u - iv \\ u &= a \cos \alpha, \quad v = -a \sin \alpha, \quad V = a \end{aligned}$$

(2) Corner flow with $\theta = 2\pi$

$$\begin{aligned} z &= re^{i\theta}, \quad w = \varphi + i\psi = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \\ \varphi &= r^n \cos n\theta, \quad \psi = r^n \sin n\theta \\ \text{For } n = \frac{1}{2}, \quad \varphi &= r^{1/2} \cos \frac{\theta}{2}, \quad \psi = r^{1/2} \sin \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

(3) Parallel ($U=3$)+circulation($\Gamma = 10\pi$) flow

$$\begin{aligned} w &= -5i \ln(re^{i\theta}) + 3re^{i\theta} = -5 \ln r + 5\theta + 3r(\cos \theta + i \sin \theta) \\ \varphi &= 5\theta + 3r \cos \theta, \quad \psi = 3r \sin \theta - 5 \ln r \end{aligned}$$

(4) Parallel flow($U=2$)+source flow($Q = 6\pi$)

$$\begin{aligned} w &= 2re^{i\theta} + 3 \ln(re^{i\theta}) \\ \varphi &= 2r \cos \theta + 3 \ln r, \quad \psi = 2r \sin \theta + 3\theta \end{aligned}$$

3. (25) 速度 U の一様流れ中に強さ Q の吹き出しが原点にある場合、この流れ場に作用する力を求めよ。

(解)

$$\begin{aligned} w &= Uz + m \ln z, \quad m = \frac{Q}{2\pi} \\ \frac{dw}{dz} &= U + \frac{m}{z} \\ \left(\frac{dw}{dz}\right)^2 &= U^2 + \frac{m^2}{z^2} + \frac{2Um}{z} \\ F_x - iF_y &= \frac{i\rho}{2} \oint \left(\frac{dw}{dz}\right)^2 dz = \frac{i\rho}{2} 2Um(2\pi i) \\ F_x &= -\rho U Q, \quad F_y = 0 \end{aligned}$$

4. (20) 二次元の渦流れで、その速度成分が $v_r = 0, v_\theta = \omega r$ なるときの渦度を求めよ。

(解)

$$\begin{aligned} v_r &= \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} = 0, \quad \psi = f(r) \\ v_\theta &= -\frac{\partial \psi}{\partial r} = \omega r, \quad \psi = -\frac{1}{2} \omega r^2 + f(\theta) \\ \psi &= -\frac{1}{2} \omega r^2 = -\frac{1}{2} \omega (x^2 + y^2) \\ \zeta &= -\nabla^2 \psi = -(-\omega - \omega) = 2\omega \end{aligned}$$